

3月 りんご生産情報



令和3年3月17日
JAつがる弘前
岩木地区営農係

管内の積雪は弘前観測所で、3月15日現在で8cmになり、平年よりも消雪が早くなると思われます。また、りんご研究所(黒石)の3月15日現在で12cmとなっております。

気象庁1か月予報では今後も気温が高く推移する予想となっているため、りんごの生態は平年よりも早まることが予想されます。剪定作業や野ネズミ対策は計画的に行いましょう！

☆野ねずみ対策

- 被害を受けた樹にはバッチレート塗布するかシーバルテープを巻いて処置しましょう。(被害の回復)
- 野ねずみの穴を見つけたら、殺そ剤(Z・P または メリーネコ)を投入しましょう。(野その密度低下)



☆粗皮削り

- 腐らん病の早期発見やハダニ類、クワコナカイガラムシの耕種的防除のため粗皮削りを行いましょう。
- イボ皮病(輪紋病)については病斑を削り取り、トップジンMペーストを塗布しましょう。

☆消雪後の管理

- 施肥はできるだけ早く行い、遅くとも4月20日までには行いましょう。
- 石灰質肥料は基肥の施肥後、降雨があった場合2~3日後、降雨のない場合は2週間くらい後に行いましょう(窒素の効果低減対策)。
- 園地では、S・Sの走路を確保するため、走路点検を行いましょう。
- 薬剤散布に向けて、S・S整備及び試運転を行いましょう。



☆マメコバチの冷蔵保管

アシガヤ筒内で蜂が動き始め、「カチカチ」と音がするようになってから0~5℃の冷蔵庫に保管しましょう。

マメコバチの冷蔵保管入庫受付について

支店名	入庫受付日	入庫場所	入庫時間
岩木支店	4月2日(金) 8日(木)	岩木第一冷蔵庫	9時~11時30分
目屋支店	4月6日(火)	西目屋CA冷蔵庫	8時30分~11時

☆霜対策

発芽期~開花期は、低温に弱い時期です。下記の資材も使用して霜対策に努めましょう。

◆防霜資材(散布資材)

資材名	規格・倍数	使用方法
霜ガード	10kg(100倍)	SS散布(霜注意報発令時に散布)マシン油以外農薬混用可
アイスバリア	1ℓ(333倍)	SS散布(霜注意報発令時に散布)薬剤混用可
グリーンステム	500g(1,000倍)	SS散布(霜注意報発令時に散布)薬剤混用可

☆桃生産情報

縮葉病対策として、発芽前の3月下旬~4月上旬までにサンソー液やチオノックFを散布しましょう。

春が近づいて来ました、資材の準備やSSの点検など春作業に備え準備は万全に行いましょう！