

5月 水稲生産情報

令和3年5月
JAつがる弘前
岩木地区営農係

育苗管理

育苗管理も後半です。温度の上がりすぎには注意しましょう。

区分	温度管理		育苗管理の注意点
	日中	夜間	
1.5~3.0 葉期	25℃前後	5℃以上	苗が伸びやすい時期です。高温に注意すると共に、育苗箱の水分を確認し、葉先が巻き始めた頃、朝方にたっぷりかん水しましょう。 ※青天の霹靂はつがるロマンより徒長しやすい品種です。水管理や温度管理は注意しましょう。
3.0~3.5 葉期	20℃前後	5℃以上	霜が降りる時以外は外気に慣らして、苗を硬く丈夫に育てましょう。 田植え5日前くらいから、日中は全面開放し、夜間は上部のみ被覆し、両裾は開放しましょう。

田植え作業

○田植え時のポイント

- 田植えは天候が穏やかな日に行いましょう。
- 植え付け目安は1坪当り80株、1株3~5本植え、植付深さ3cm程度（青天の霹靂は1坪当り70株植）3cm以上の深植えは分けつを抑制してしまうので控えましょう。
徒長した老化苗は健苗と比べ植付後の活着が悪く、初期生育が劣ります。適期の田植えを心がけましょう。
- 強風などで代枯れが懸念される場合、田植え前日にプロテックαの200倍液を200cc/箱散布しましょう。

○初期病害虫防除剤の使用法（箱施用剤）

昨年はイネドロオウムシによる被害が多く見られました。被害が予想される圃場では下記の薬剤を使用しましょう。

薬剤名	1箱当 施用量	1袋当たり	使用時期	対象病害虫	備考
ブイゲットバイソン粒剤 ★新商品★	50g	20枚分 (1kg)	緑化期 ~移植当日	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ いもち病	
パダン粒剤	80g	38枚分 (3kg)	田植え当日	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ	青天の霹靂出荷の場合、パダンのみ使用可能です。

※西目屋ミニライスセンターへ出荷する方は下記の薬剤を使用してください。

薬剤名	1箱当 施用量	1袋当たり	使用時期	対象病害虫	備考
ゴウケツバスター箱粒剤 ★新商品★	50g	20枚分 (1kg)	移植前3日 ~移植当日	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ いもち病	西目屋ミニライスセンターに入庫される方専用。

田植え後の水管理

日中止水・夜間かんがい（夕方又は早朝に入水）の基本を守り水温を保ちましょう。

時期	暖かい日の水管理	寒い日の水管理
活着期	2~3cmの浅水	4~5cmの深水
分けつ期	3cm程度の浅水	5~6cmの深水

除草剤の散布

中期剤の施用タイミングが遅く、雑草が繁茂している圃場が散見されます。雑草が見られたら早急に除草剤を施用しましょう。

【一発除草剤処理】

使用時期	除草剤名
田植え直後	トップガン（粒・F）
	シリウスエグザ（粒・F・ジャンボ）
	ウィナー（粒・F・ジャンボ）
	ゼータタイガー1キロ粒剤
田植え後 3日~	トップガンジャンボ ゼータタイガー（F・ジャンボ）

【初期・中期体系処理】

使用時期	初期剤	中期剤
	田植え直後~ 田植え後5日	ソルネット1キロ粒剤
エリジャン乳剤		田植え後14日~ (ノビエ3.5葉期まで) セカンドショットSジャンボMX
ショキニー250グラム		田植え後10日~ (ノビエ3.5葉期まで) マメットSM粒剤

青天の霹靂、西目屋地区の農薬節減米を栽培される方は、ゼータタイガー（フロアブル・1キロ粒剤・ジャンボ）を使用してください。