



# 水稻生産情報 4 月外勤号



令和7年4月7日  
東地区営農係

3月は、後半にかけて気温が高めに推移したことから、急激に消雪が進みました。  
今後の気象予報では、4月中旬にかけて平年より気温が高い見込みとなっておりますので、  
浸漬中の発芽に気をつけ、水の入れ替えを行い、温度管理を徹底しましょう。

## 1. 作業スケジュールの目安（田植え日が5月20日の場合）

| 月日 | 4月12日頃まで       | 4月10日頃 | 4月13日 | 4月15日 | 4月16日 | 5月20日 |
|----|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 作業 | 浸漬<br>10～14日程度 | 床土作り   | 催芽    | 播種    | 育苗管理  | 田植え   |

## 2. 催 芽 芽や根の伸ばしすぎに注意しましょう！

- ・温度は30～32℃で16～20時間程度行いましょう（ハト胸程度を目安にしましょう）。
- ・温度が40℃以上になると、発芽能力が低下するので注意しましょう。



## 3. 播 種 適正な播種量しましょう。

1箱あたり催芽粃で120～130g程度にしましょう  
（厚播きをすると徒長苗やムレ苗などの原因となります）。

※苗代やハウス等の雪解けを促すために消雪剤等を散布し、春作業を計画的に進めましょう。

## 4. 床土作り → 人工培土は乾燥しやすいため、水管理には注意しましょう。

| 資材名              |                     | 山土の場合                                         | 人工培土の場合                          |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| サイコー11号<br>（肥料）  |                     | 20g/箱<br>（5kgで250枚分）                          | 肥料分が入っているため不要<br>※無肥料培土の場合は山土と同様 |
| 新ロング苗箱専用<br>（肥料） |                     | 100g/箱<br>（20kgで200枚分）                        |                                  |
| どちらか             | ナエファイン粉剤<br>（農薬）    | 8g/箱（土壌混和）<br>（1kgで125枚分）                     | 6g/箱（土壌混和）<br>（1kgで166枚分）        |
|                  | ナエファイン<br>フロアブル（農薬） | 播種時灌注2,000倍（1ℓ/箱）<br>又は<br>緑化期1,000倍（500cc/箱） |                                  |

## 5. 置 床

置床は出芽を揃えるため育苗箱の底が密着するように均平にしましょう。  
また、置床の硬さは「耳たぶ」程度に調整しましょう。

## 6. 出 芽 → 箱土が乾燥すると出芽が不揃いになり、過湿だとクモの巣カビが出やすくなるので水管理には注意しますしょう。

- ・ハウス育苗では水分保持と保温のためシルバーポリトウなどで平張り被覆し、8割程度（4～6日）の出芽を確認したら速やかに取り除き、日光を当てましょう。（例年5日程度）  
取り除くのが遅れると、芽の伸びすぎやクモの巣カビ発生の原因となります。
- ・必ず温度計を設置し、播種から5日間は施設内の日中温度が35℃以上になる場合は換気を行い、夜間温度が10℃以下にならないよう、保温に努めましょう。

◎適期



◎剥ぎ遅れ伸ばしすぎ

